

No. 2056.

Observations

Sur le traitement et la Cure des
Polypes Uterins qui ont franchi
la Vulve.

I. obs.

Une Domestique, âgée de 38 ans, étant
à la garde-robe, sentit à la vulve, en 1774,
un corps oblong, charnu, d'un médiocre volume.
pendant quelques jours elle se tut sur son état.
gênée enfin, inquiète, elle consulta son Chirurgien
qui prit la tumeur pour une descente de
matrice, la fit rentrer et prétendit la contenir
à l'aide d'un pessaire.

Cette incommodité reparut très-souvent dans
la suite et fut presque toujours soignée par
la malade elle-même.

tantôt il s'écouloit des voies utérines une
grande quantité d'eaux rouges, tantôt beaucoup
de fleurs blanches et quelquefois une assez grande
quantité de sang. néanmoins les règles ne parurent
jamais dérangées.

Vers le mois d'Aoust, 1776, environ deux
ans après la première apparition, le corps
susdit étoit devenu très-embarrassant; sans une
il tendoit à s'échapper et sans une la malade
s'opposoit à sa sortie. mais, le 21 j^{bre}, en



ARC 18 d⁴ 4 bis n° 56

rendant les urines, ce qu'elle craignoit tant,
arriva: une masse triangulaire, molle, rouge,
cuvée volumineuse que la tête d'un enfant à terme,
dont la pointe étoit à la vulve, sortit, rapide-
ment et sans douleurs, du vagin: cette masse
partout intégrée, un peu aplatie en avant et
en arrière, portoit sur sa face antérieure, près
de la pointe, une appendice longue, grasse com-
me l'index et figurée en croûte.

Après plusieurs tentatives inutiles pour rédui-
re la tumeur prétendue, on fit porter la malade à
l'hôtel-Dieu, où j'e l'examinai aussitôt. J'enkois
librement dans le vagin, mon doigt y faisoit le tour
du pédicule, il sentoit une portion de l'orifice de la
matrice, et ramena le pessaire. la tumeur échappée
n'offroit aucune espèce d'ouverture, étoit insensible.
les matières pouvoient glaireuses, quelquefois sanguinolentes
(1) S'écouloient positivement de la vulve. j'en vis
donc et ne dut voir qu'un polype utérin.

Comme il suffisoit de ne pas abandonner la
tumeur à son propre poids pour éviter des tiraill-
lements dans le ventre et dans les reins, un quel-
qu'accident qu'éprouvoit la malade, j'e la disposai
à la ligature en vuident les premières voies.

La veille de l'Opération elle étoit en proie à
fièvre que j'attribuai, au défaut d'autres causes ap-
parentes, au mal-aise de la situation et à la mal-
propreté qu'entraînoit son état.

(1) Jus qu'à ce que la tumeur fut
entièrement frappée de pourriture,
quand il m'échappoit, en la tenant,
de la racine, il en résultoit
toujours une perte relative à la
durée et à la force de la torsion.

Le 28^e jour, la fièvre ayant cessé, la malade se trouvant bien, j'ai, le pédicule du polype au niveau de la vulve, avec un fil d'argent. toutes les 12 heures je détordois les branches du fil pour faire ensuite une nouvelle ligature, une ligature plus exacte, ce à quoi je parvenois sans peine avec la précaution d'employer une nouvelle étendue de fil, que je serrais, et que je fixois, ainsi serré, en tordant deux fois les branches.

la tumeur se gonfla, devint dure et noircit de plus en plus jus qu'à la fin du troisième jour: à cette époque elle commença à se flétrir, à diminuer, et tomba enfin vingt-quatre heures après (2). tout ce qui existoit du pédicule au dessus de la ligature se tuméfia aussi par degrés; gros seulement comme le pouce, mollet, dans son principe, il devint ferme et du diamètre de plus de deux travers de doigt: sa surface divisée suppurait beaucoup; elle demeura invariablement à la vulve jus qu'à l'instant de la chute de la tumeur; alors elle recuint et disparut.

jusqu'à tout s'étoit passé à souhait. mais le 29 il y eut une fièvre légère; j'ai vu ^{l'indice} de la suppuration et l'effet d'un échaume occasionné par le voisinage d'une porte, par les humidités dans lesquelles le siège de la malade avoit baigné presque continuellement, quelque soin qu'on apporte, et par la nécessité dans laquelle on avoit été de la

(2) elle pèsait 30 onces. La substance intérieure étoit un parenchyme flasque, ecchymosé, noirâtre, traversé de vaisseaux médiocres, enveloppé d'une membrane peu épaisse.



découru souvent : la toux, l'enrouement subsis-
tèrent : la Respiration ne parut jamais gênée.
la fièvre s'accrut peu-à-peu et excita des
sueurs abondantes : le pouls étoit plein, fort. les
pieds d'abord, puis les jambes, ensuite les cuisses,
le ventre, le visage s'œdématisèrent : une douleur
permanente tantôt vive, tantôt modérée se fixa
à la région hypochondriaque droite. la malade ne se
couchoit que sur le dos, son attitude y étoit tou-
jours horizontale, et lors que ses besoins exigeoient
qu'elle se mit sur l'un des côtés, elle s'y portoit
avec aisance, seulement elle usoit de ménagemens
quand la douleur de l'hypochondre s'exagéroit. la
langue fut constamment sèche, noire. les urines
passoient bien. le ventre se lâcha de bonne heure
et cette larité dégénéra bientôt en une diarrhée col-
liquative qui ne cessa qu'à la mort, le 21 8^{bre}.
environ les 12 derniers jours de sa vie, dès que
cette fille s'endormoit, elle se plaignoit continuelle-
ment ; si on l'éveillait pour l'interroger à cet égard,
elle restoit surprise des questions qu'on lui faisoit ;
elle n'avoit, disoit-elle, ni le besoin ni l'intention de
se plaindre.

Huit jours après la chute de la tumeur, on cessa
les injections, rien n'indiquoit plus leur utilité.

Aussi empressé de connoître les causes de la mort
quel'état des parties génitales, je portai d'abord
mes recherches sur le ventre : tous les viscères y

étoient dans le meilleur ordre possible. passant ensuite à la prostate je trouvais le côté droit rempli d'eau, les surfaces de la pleure et du poulmon-matériels, épaissies; ça et là j'enlevais des plaquants de tissu cellulaire abouvi, gonflé, demi-purulent, qui fondoient entre mes doigts. ayant emporté le rectum, la matrice, la vemie et la Symphise du pubis pour examiner mieux les choses, j'incisai le Vagin, le long de sa partie latérale droite, puis je le coupai en travers au haut de sa partie antérieure: il ne manquoit à ce conduit pour être dans l'état le plus déirable que l'absence d'une légère excoriation, d'une destruction inégale et assez étendue de la muqueuse mince qui le revêt: ce très léger désordre existoit au côté gauche; il étoit évidemment l'effet de la présence du pessaire, puis que c'est de là que je le retirai, puis qu'il avoit le plus grand rapport avec la forme et les points de contact de ce corps étranger. l'orifice intérieur du col de la matrice étoit arrondi: son rebord gauche présentoit une plaque rouge, de l'étendue d'une pièce de 5 sols, molle comme le reste de l'orifice, en aucune manière entamée. ce fut là la seule trace que je pus rencontrer de l'adhérence du polype. la cavité du col étoit un peu plus ample que de coutume; son orifice interne se trouva absolument oblitéré, la sonde, le stilet, la pointe des ciseaux, l'oeil ne découvrirent aucune communication entre la cavité du col et la cavité du corps de la matrice,



il fallut diviser le corps de ce visière séparément pour en examiner la cavité; elle étoit humide, mais sans aucun amas humoral quelconque.

Trois végétations charnues, dures comme la matière, blanches comme elle, d'inégale longueur et grosseur étoient intérieurement attachées à la paroi postérieure; la Supérieure, plus forte, pouvoit être longue de 7 lignes et large de 2, presque partout; les deux autres plus inférieures, parallèles entr'elles, n'avoient guères que 3 et 4 lignes de long et s'terminoient en pointe.

Le Lophpe, le pessaire retenu longtemps dans le vagin auroient-ils favorisé l'occlusion de la matrice, en faisant dévier son col et en lui prêtant un appui nuisible? Si la malade avoit échappé à son accident, n'en est-il pas vraisemblable que les enroulemens de la matrice se seroient développés, et que tôt ou tard on auroit vu cette fille plus ou moins souffrante, victime d'une maladie impénétrable, attribuée peut-être au traitement de la première?

Quoi qu'il en soit je ne vis pas sans regrets la porte de cette fille. ébloui par les premiers succès, j'osai espérer qu'ils seroient durables, mais bientôt je devins le jouet d'une maladie qui suscita très-souvent des symptômes mensongers (3); ils me trompèrent presque tous: la région du foie m'occupait sans cesse, je plaçai sur ce visière une sorte de métastase qui me paroissoit s'accumuler dans

(3) De haen tom. 2 et 3. rat.
med. edit. Paris.

la proportion, que la maladie utérine diminueoit.

Pendant que la ligature entouroit la racine du Polype, j'étois fort en peine de ce que devoit être cette grosse portion cylindrique qui remplissoit le vagin. les cures fautes obtenues par la plupart de ceux qui ont attaqué ces fungus ne me ramenoient pas. la matrice étoit un peu enhaïnie hors de sa place naturelle, mais ce que je pouvois distinguer de l'orifice étoit encore loin de la vulve et cela me donnoit de la méfiance sur le rétablissement des parties, sur le dégoûment consécutif d'ailleurs de l'insertion: ils furent néanmoins suffisants; et, d'après cet exemple, loin de redouter à l'avenir, de laisser une partie du pédicule, il me sembla au contraire que je craindrois de porter la ligature ou sur la substance même du col de la matrice ou sur celle du vagin.



Il est universellement reçu, que la ligature est la meilleure méthode de procurer la chute des tumeurs polypeuses. mais d'aus celles qui ont franchi la vulve soit en grande partie, soit en totalité, est-il plus avantageux de s'en débarrasser de bonne heure en les amputant au dessous de la ligature? vaut-il mieux les laisser péro en place?

qu'il me soit permis de soumettre encore au jugement de l'Académie deux procédés qui mériteroient l'attention de l'un de ses membres les plus distingués. M^r Serres dit que l'un

et l'autre ont également et aussi parfaite-
ment réunis (1). cette asportion me paroît
les autoriser trop indistinctement; j'erois qu'ils
doivent être assujettis à une application métho-
dique. Si l'on veut comparer scrupuleusement
les 18 observations dont on a fait usage
dans les trois premiers articles du mémoire
cité, on verra que le petit nombre d'exemples
où les tumeurs sont mortuaires en place, offre des
guérisons plus promptes et plus sûres que
ceux dans les quels on s'est hâté de les rehan-
cher. j'ai bien que la seconde pratique
n'a aucuns des inconvénients de la première;
qu'avec elle-ci la tumeur a besoin d'être putré-
faite sans quoi elle gêne par son poids, par sa cau-
tion; qu'elle donne lieu à des humidités plus
ou moins abondantes qui mouillent la malade;
que l'effusion des urines dans le lit est presque in-
évitable; que le fungus se putréfiant infecte et
la malade et ceux qui l'approchent; que ces
inconvénients durent 4, 8, 6 jours. mais, si
la section de la tumeur obvie parfaitement à
tout cela, les parties restantes demeurent char-
gées d'une ligature qu'elles entraînent souvent
au haut du vagin; et cette ligature qui n'est
plus sous nos yeux, qui n'est plus en notre
puissance, dont nous ignorons absolument les

(1) vid. Mém. de l'Acad. tom. 3.
édit. in-4^o p. 362, 380.

vrais effets, devient, lors que le hazard nous
 sert mal, un objet d'inquiétude pour nous
 et pour les malades une cause qui peut re-
 tarder leur guérison et proroger leurs infirmi-
 tés. en effet, après avoir appliqué une liga-
 ture sur le col plus ou moins gros, plus
 ou moins consistant d'un polype, est-on toujours
 certain de l'interruption de la vie dans la
 masse polypeuse? les précautions prises par
 ceux qui ont laissé périr ces tumeurs en place,
 par ceux qui les ont attaquées lors qu'elles étoient
 encore dans le vagin, déposent contre cette
 opinion. admettons que la ligature agisse
 avec toute l'efficacité désirable sur les parties
 qu'elle embrasse: qu'en résultera-t-il? rare-
 ment cette efficacité sera permanente, parce
 que dans la plupart des cas, les parties pres-
 que toujours tendues, exposées à l'action im-
 médiate du fil, seront assez tôt débrutées pour
 relâcher et rendre inutile le lien sur lequel
 on comptoit: le sang ne reprendrait-il ensuite
 la route que dans une seule artériole, en
 voilà assez pour nourrir la portion subsistante
 du pédicule, et pour lui conserver un diamè-
 tre supérieur à l'autre du corps échangé.
 enfin, ce qu'on n'obtient que de huit, dix,
 douze ligatures, pourquoi l'attendre d'une
 seule?



Mes vœux ne sont pas chimériques :
elles ont pris quelque force dans les observations-
mêmes mises en œuvre par M^r Levet :
J'y vois la ligation tombée une fois dans les
premiers jours de son application, puis 3, 4,
6, 8, 10, 22 jours après. mais ce qui les
a confirmés c'est le fait qui est à la tête
de la Dissertation de M^r Natio (5).

(5) De Sarcomate e puerulo mu-
licui sectione sublato. Disput. Chir.
lect. ex collect. Gall. tom. III. pag.
621 et seq. — M^r Levet, art.
v. S. 11. de son mémoire, a cité
cette observation en preuve de
Sérpés amputés sans ligation.
il seroit bien étonné que ce
grand homme ait écrit avec la
Notice de M^r Delpalle : Enorme
Sarcoma sectione absque vinculo
remotum Sal. pag. 655. collect. Gall.

Une femme de 48 ans, sujette depuis lois
à des pertes fréquentes et considérables, d'écouvit,
après deux années de cet état, une tumeur dans
le vagin, qui s'y développant peu-à-peu,
en remplit toute l'étendue, déborda les grandes
lèvres, et occasiona par sa pression sur le col de
la verge et le rectum, des difficultés d'uriner,
d'aller du ventre et de vives douleurs à la région

11. OBS.
par M^r Abrah. Natio.

lombaire. toutes ses tentatives, pour repousser
la tumeur, étant inutiles, elle eut l'impétuosité
de saisir la portion protubérante et d'en rebran-
cher, gros comme le poing, avec un couteau.
une femme de cette trempe devoit peu ménager
ses efforts, la saillie que formoit la tumeur devoit
être en mauvais ordre, aussi n'y eut-il point
d'hémorrhagie. cette résécution fut infructueuse,
elle ne rémédia à aucun des maux qui
l'avoient suggérée, au contraire, ils en firent
aigres. malgré cela, le lendemain, en rendant
ses efforts, elle chassa tout-à-coup et avec
des douleurs égales à celles de l'accouchement,
une masse plus volumineuse que la tête, d'un
pubide et très-incommode par sa pesanteur.
les crises n'en vinrent pas plus aisément, il fallut
que la malade en facilitât l'issue en plaçant les
doigts sous les pubis, en écartant la pression; leur
écoulement sur la tumeur y excita une irritation,
une inflammation, un gonflement tel qu'il n'étoit
plus possible d'approuver les parties extérieures
de la génération. le Chirurgien, maître alors,
d'impuiser accident, put voir au bout de quelques
jours que la tumeur sortoit du vagin et avoit
un pédicule blanchâtre, de deux doigts d'épaisseur.
l'impossibilité de la réduire, la putrification dont
elle étoit atteinte, firent d'abord naître l'idée



de l'amputation. le Médecin, appelé en consultation, désapprouva ce moyen; l'énormité de la tumeur, l'épuisement du sujet, rendoient l'hémorrhagie formidable, et il craignoit qu'on imputa à l'opération tous les événements fâcheux dont la malade étoit menacée. il fallut pourtant prendre un parti, la malade l'exigeoit, la résolution étoit positive, elle se feroit elle-même débarrassée du fardeau si on ne lui eût enlevé son champ. en conséquence, sans plus perdre de temps, on traversa le col de la tumeur avec une aiguille garnie d'un fil cire, on fit la ligature, puis, au-dessous d'elle, la section. les suites furent aussi heureuses qu'on les desiroit. à mesure que les parties se rétablirent elles entraînent avec elles la ligature. la malade ne quitta le lit qu'environ quinze jours et se rétablit peu-à-peu. elle conserva néanmoins intérieurement une sensation douloureuse de pression; et le gonflement oedémateux des pieds qu'elle avoit dès avant l'opération, loin de céder aux anti-cachectiques, augmenta de jour en jour, ce qui, joint à une perte abondante qui revenoit de temps à autre, faisoit craindre l'hydropisie. elle vécut près de six mois et étoit languissant; mais, à cette époque, elle s'apperoit

que quelque chose l'incommodoit, lui pressoit
dans le vagin, elle y porta les doigts et en reti-
ra le lien qui avoit servi à la ligature, lieu
qu'elle reconnut et qu'elle fit voir à ses libé-
rateurs. Dès lors elle commença à se bien
porter.

Quoi qu'il soit difficile de concevoir comment
cette ligature a pu être oubliée, on ne sauroit nier
qu'elle ait eu la plus grande influence sur
l'état valétudinaire du sujet: Sans doute on
s'en seroit occupé, on l'auroit ébranlé, on en
auroit accéléré la chute avec l'attention de
couper les fils moins près; mais il est plus clair
qu'on eût tout évité en laissant mourir la
tumeur en place. Je peux donc, sans mécon-
noître les bornes que l'art fait unique, con-
clure que la certitude et l'honneur de l'art
réprochent la section des tumeurs polypeuses après
une première ligature.

Cette conséquence ne rend point exclusive la
pratique de faire périr les tumeurs en place, elle
ne touche même pas à leur soustraction dans les
cas qui la requièrent (6), seulement elle rend
suspect leurs amputations préliminaires, et demande
qu'on n'y procède qu'avec des raisons suffisantes
d'être persuadé que la chute de la partie liée
se fera au lieu même de la ligature.



(6) vid: Mem. de l'Acad. tom. III.
p. 363.

Tangles Chirurgien Stipendié de l'hôtel-Dieu
et de la Ville de Beauvais. ff.

